Herfst

Iedereen een boom
‘klein groen’

Amberboom

Liquidambar styraciflua Worplesdon

Categorie: herfst, 2e grootte

Kroonvorm: breed-piramidevormig, halfopen kroon

Blad: donkergroen

Herfstkleur: geel, oranje, rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: geelgroene bloemen in april-mei

Bestand tegen: vorst, verharding, extreme regenval

De boom groeit in zijn jongere jaren smal omhoog, later gaan de takken meer afstaan waardoor de kroon een piramidevorm krijgt. Bij een vochtige standplaats van de boom zal de bladverkleuring in de herfst intenser zijn. De bladeren krijgen een geeloranje tot oranjerode kleur in de herfst en vallen voor de winter van de boom.

Na de bloeitijd van de onopvallende geelgroene bloemen groeien er doosvruchten die lang blijven hangen aan de boom. De soort kan goed tegen onvoorspelbaar klimaat en veel regenval.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Amerikaanse es

Fraxinus americana Autumn Applause

Categorie: herfst, 2e grootte

Kroonvorm: breed-eirond, halfopen kroon

Blad: diepgroen

Herfstkleur: rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: purpergroene bloemen in april

Bestand tegen: vorst, wind, strooizout, halfverharding

Het diepgroene blad van deze boom verschijnt laat en blijft relatief kleiner dan andere bomen van deze soort. In de herfst krijgen de bladeren een dieprode kleur en blijven aan de boom hangen tot de eerste nachtvorst. De boom is in de winter kaal en wordt daarom bladverliezend genoemd.

De ‘Autumn Applause’ heeft in april bloeiende purpergroene bloemen die onopvallend in de boom hangen. Aan deze boom groeien er geen vruchten.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Amerikaans kornoelje

Cornus nuttallii Monarch





Categorie: herfst, 3e grootte

Kroonvorm: breed kogelvormig, halfopen kroon

Blad: groen

Herfstkleur: geel, oranje, rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: groengele bloemen in mei

Bestand tegen: n.v.t.

De bloei van deze boom is uitbundig door zijn groene onopvallende bloemen met daaromheen grote witte schutbladeren die wel tot 10 cm groot kunnen worden. Na de bloeitijd in de vroege herfst verschijnen de oranjerode vruchten. Daarnaast kleuren de groene bladeren geel, oranje en rood.

De boom heeft een oppervlakkig maar fijn wortelstelsel en is niet goed bestand tegen koude wind of verharding.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Amerikaanse haagbeuk

Carpinus caroliniana



Categorie: herfst, 2e grootte

Kroonvorm: ongregelmatig rond. dichte kroon

Blad: blauwgroen

Herfstkleur: oranjerood

Status: uitheems

Bloeiperiode: groene katjes in april

Bestand tegen: vorst, wind, halfverharding

De Amerikaanse haagbeuk heeft blauwgroene bladeren die in de herfst oranjerood kleuren. In de winter is deze boom haal tot het voorjaar wanneer de nieuwe bladeren beginnen te groeien en in april de groene katjes gaan bloeien.

De groene lange vrouwelijke katjes hangen in trosjes aan de takken en hebben een sierlijk effect. De vruchten zijn klein, groen en onopvallend en verkleuren in de herfst samen met de bladeren roodbruin.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Japanse schijniep

Zelkova serrata Village Green



Categorie: herfst, 2e grootte
Kroonvorm: vaasvormig, halfopen kroon
Blad: groen
Herfstkleur: geel, oranje, rood
Status: uitheems
Bloeiperiode: april-mei
Bestand tegen: vorst, verharding

De groene bladeren zijn aan de onderkant lichtgroen gekleurd en hebben een kartelige bladrand die lijken op zaagtanden. Het woord serrata dat terug te vinden is in de wetenschappelijke naam, betekend vertaald ook gezaagd.

In de herfst verkleuren de bladeren van groen naar geeloranje tot bronskleurig rood. In de winter verliest de boom al zijn bladeren. Een voordelige eigenschap van de ‘Village Green’ is dat hij ongevoelig is voor de iepenziekte.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Koreaanse schijn-camelia

Stewartia Pseudocamellia Koreana

Categorie: herfst, 2e grootte

Kroonvorm: breed-piramidevormig, open kroon

Blad: donkergroen

Herfstkleur: oranje, rood

Status: uitheems

Bloeiperiode: witte bloemen in juni-juli

Bestand tegen: vorst

De boom heeft eerst een piramidevormige kroon die later ovaal wordt. De onderbast van schijncamelia heeft een beige, oranje, kameelachtige kleur die zichtbaar wordt bij het afschilferen van de buitenste bast.

De bladeren zijn donkergroen en krijgen in de herfst een oranje tot roodachtige kleur. In juni en juli gaan de witte alleenstaande bloemen met duidelijk zichtbare gele meeldraden bloeien. Dit kan tot augustus doorlopen. Hierna komen de houtige doosvruchten.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Krenten-boompje

Amelanchier arborea
Robin Hill



Categorie: herfst, 3e grootte
Kroonvorm: ovaal, halfopen kroon
Blad: donkergroen
Herfstkleur: geel, rood
Status: uitheems
Bloeiperiode: witte bloemen in begin april
Bestand tegen: vorst, wind, strooizout en halfverharding

De bast van het krentenboompje valt op in de winter door zijn grijze kleur. De bladeren hebben een donkergroene kleur die in de herfst vervangen wordt door gele en rode tinten. Deze bladverliezende soort is in de winter kaal tot begin april als de witte bloemen gaan bloeien die in trossen over de hele boom hangen.

In de herfst verschijnen er bessen die eerst donkerrood zijn, maar later een zwarte kleur aannemen. Deze vruchten zijn eetbaar in de vorm van krenten.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Perzisch ijzerhout

Parrotia persica Vanessa

Categorie: herfst, 2e grootte

Kroonvorm: ovaalvormig, halfopen kroon

Blad: groen

Herfstkleur: geel, rood, purper

Status: inheems

Bloeiperiode: rode bloemen in februari-maart

Bestand tegen: vorst, wind

De schors van ‘Vanessa’ heeft een lichtgrijze kleur met paarsbruine vlekken en afbladderende schorsplaten. De groene bladeren van deze boom kleuren in de herfst van geel tot rood en purper.

In februari en maart zijn de rode bloemen te zien van ongeveer 2 cm groot en hebben felrode helmknoppen. Na de bloeitijd volgen de gehoornde bruine vruchten. De soort is bladverliezend en brengt de winter kaal door.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Rode esdoorn

Acer rubrum Autumn Flame

Categorie: herfst, 2e grootte
Kroonvorm: breed-eirond, dichte kroon
Blad: groen
Herfstkleur: oranjerood
Status: uitheems
Bloeiperiode: n.v.t.
Bestand tegen: vorst, halfverharding

Door de dichte en breed-eivormige kroon heeft deze rode esdoorn ruimte nodig. De bladeren zijn groen gekleurd en veranderen in de herfst naar een oranjerood tot donkerrode kleur. De bladeren van deze soort blijven langer aan de boom hangen dan verwante soorten. Het is een bladverliezende bomen waardoor deze kaal is in de winter.

De Autumn Flame heeft geen bloemen of vruchten. Vorst en halfverharding zijn geen bedreiging voor de boom.

Iedereen een boom
‘klein groen’

Rode esdoorn

Acer rubrum Sun Valley

Categorie: herfst, 3e grootte
Kroonvorm: ovaal, dichte kroon
Blad: donkergroen
Herfstkleur: rood
Status: uitheems
Bloeiperiode: rode bloemen in maart
Bestand tegen: vorst, halfverharding

De Sun Valley is een kruising tussen de Red Sunset en de Autumn Flame en heeft daarmee de eigenschap verkregen beter bestand te zijn tegen dwergcicaden. De donkergroene bladeren van deze boom kleuren in de herfst dieprood.

In maart bloeien de rode bloemen aan de boom. Deze worden niet gevolgt door vruchten. In de winter is de boom geheel kaal aangezien het een bladverliezende boomsoort is.